

	大腸癌登録レジメン一覧
大腸01	CAPOX
大腸02	CAPIRI
大腸03	SOX
大腸04	SIR(3W)
大腸05	IRIS(4W)
大腸06	mFOLFOX6
大腸07	FOLFIRI
大腸08	FOLFOXIRI
大腸09	Bev+mFOLFOX6
大腸10	Bev+FOLFIRI
大腸11	Bev+FOLFOXIRI
大腸12	Bev+CAPOX
大腸13	Bev+SOX
大腸14	Bev+SIR(3W)
大腸15	Bev+IRIS(4W)
大腸16	Pmab+mFOLFOX6
大腸17	Pmab+FOLFIRI
大腸18	Pmab+CPT11
大腸19	Pmab
大腸20	Bev(2W)
大腸21	Bev(3W)

プロトコール名

【大腸01】 CAPOX

投与スケジュール

3週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8	day15
①	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	●	×	×
②	カペシタビン	2000mg/m ²	経口			×

備考

②カペシタビンはDay1～14まで服用後、1週休薬

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸02】 CAPIRI

投与スケジュール

3週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8	day15
①	イリノテカン	200mg/m ²	90分	●	×	×
②	カペシタビン	1600mg/m ²	経口			×

備考

②カペシタビンはDay1～14まで服用後、1週休薬


衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸03】 SOX

投与スケジュール

3週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8	day15
①	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	●	×	×
②	S-1	80～120mg	経口			×

備考

②S-1はDay1～14まで服用後、1週休薬

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸04】 SIR(3W)

投与スケジュール

3週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8	day15
①	イリノテカン	150mg/m ²	90分	●	×	×
②	S-1	80~120mg	経口			×

備考

②S-1はDay1~14まで服用後、1週休薬


衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸05】 IRIS (4W)

投与スケジュール

	薬剤名	投与量	点滴速度
①	イリノテカン	125mg/m ²	90分
②	S-1	80~120mg	経口

4週毎			
day1	day8	day15	day22
●	×	●	×
		×	×

備考

②S-1はDay1~14まで服用後、2週休薬

プロトコール名

【大腸06】 mFOLFOX6

投与スケジュール

2週 or 3週

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8
①	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	●	×
②	レボホリナート	200mg/m ²	120分	●	×
③	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	●	×
④	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	●	×

備考

④はインヒューザーポンプ使用

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸07】 FOLFIRI

投与スケジュール

2週 or 3週

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8
①	イリノテカン	150mg/m ²	90分	●	×
②	レボホリナート	200mg/m ²	120分	●	×
③	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	●	×
④	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	●	×

備考

④はインヒューザーポンプ使用

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸08】 FOLFOXIRI

投与スケジュール

2週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8
①	イリノテカン	165mg/m ²	60分	●	×
②	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	●	×
③	レボホリナート	200mg/m ²	120分	●	×
④	フルオロウラシル	3200mg/m ²	48時間	●	×

備考

④はインヒューザーポンプ使用

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸09】Bev+mFOLFOX6				投与スケジュール	
				2週毎	
	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8
①	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	●	×
②	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	●	×
③	レボホリナート	200mg/m ²	120分	●	×
④	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	●	×
⑤	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	●	×

備考

①初回90分、2回目60分、以降30分まで短縮可
⑤はインヒューザーポンプ使用

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸09】Bev+mFOLFOX6

投与スケジュール

3週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8	day15
①	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	●	×	×
②	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	●	×	×
③	レボホリナート	200mg/m ²	120分	●	×	×
④	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	●	×	×
⑤	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	●	×	×

備考

- ①初回90分、2回目60分、以降30分まで短縮可
⑤はインヒューザーポンプ使用

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸10】 Bev＋FOLFIRI				投与スケジュール	
				2週毎	
	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8
①	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	●	×
②	イリノテカン	150mg/m ²	90分	●	×
③	レボホリナート	200mg/m ²	120分	●	×
④	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	●	×
⑤	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	●	×

備考

①初回90分、2回目60分、以降30分まで短縮可
⑤はインヒューザーポンプ使用

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸10】 Bev＋FOLFIRI

投与スケジュール

3週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8	day15
①	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	●	×	×
②	イリノテカン	150mg/m ²	90分	●	×	×
③	レボホリナート	200mg/m ²	120分	●	×	×
④	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	●	×	×
⑤	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	●	×	×

備考

- ①初回90分、2回目60分、以降30分まで短縮可
⑤はインヒューザーポンプ使用

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸11】 Bev+FOLFOXIRI

投与スケジュール

2週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8
①	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	●	×
②	イリノテカン	165mg/m ²	60分	●	×
③	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	●	×
④	レボホリナート	200mg/m ²	120分	●	×
⑤	フルオロウラシル	3200mg/m ²	48時間	●	×

備考

①初回90分、2回目60分、以降30分まで短縮可
⑤はインヒューザーポンプ使用

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸12】 Bev + CAPOX

投与スケジュール

3週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8	day15
①	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	●	×	×
②	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	●	×	×
③	カペシタビン	2000mg/m ²	経口			×

備考

- ①初回90分、2回目60分、以降30分まで短縮可
- ③カペシタビンはDay1～14まで服用後、1週休薬

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸13】 Bev＋SOX

投与スケジュール

3週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8	day15
①	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	●	×	×
②	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	●	×	×
③	S-1	80～120mg	経口			×

備考

①初回90分、2回目60分、以降30分まで短縮可

③S-1はDay1～14まで服用後、1週休薬


衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸14】 Bev + SIR (3W)

投与スケジュール

3週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8	day15
①	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	●	×	×
②	イリノテカン	150mg/m ²	90分	●	×	×
③	S-1	80~120mg	経口			×

備考

①初回90分、2回目60分、以降30分まで短縮可

②S-1はDay1~14まで服用後、1週休薬

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸15】 Bev+IRIS(4W)

投与スケジュール

	薬剤名	投与量	点滴速度
①	ベバシズマブ	5mg/kg	90分
②	イリノテカン	125mg/m ²	90分
③	S-1	80~120mg	経口

4週毎			
day1	day8	day15	day22
●	×	●	×
●	×	●	×
➡		×	×

備考

- ①初回90分、2回目60分、以降30分まで短縮可
- ③S-1はDay1~14まで服用後、2週休薬

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸16】 Pmab + mFOLFOX6

投与スケジュール

2週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8
①	パニツムマブ	6mg/kg	60分	●	×
②	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	●	×
③	レボホリナート	200mg/m ²	120分	●	×
④	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	●	×
⑤	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	●	×

備考

⑤はインヒューザーポンプ使用

プロトコール名

【大腸17】 Pmab＋FOLFIRI

投与スケジュール

2週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8
①	パニツムマブ	6mg/kg	60分	●	×
②	イリノテカン	150mg/m ²	90分	●	×
③	レボホリナート	200mg/m ²	120分	●	×
④	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	●	×
⑤	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	●	×

備考

⑤はインヒューザーポンプ使用

プロトコール名

【大腸18】 Pmab + CPT11

投与スケジュール

2週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8
①	パニツムマブ	6mg/kg	60分	●	×
②	イリノテカン	150mg/m ²	90分	●	×

備考

--

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸19】 Pmab

投与スケジュール

2週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8
①	パニツムマブ	6mg/kg	60分	●	×

備考

--

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸20】 Bev(2W)

投与スケジュール

2週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8
①	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	●	×

備考

①初回90分、2回目60分、以降30分まで短縮可

衣笠病院 化学療法委員会

プロトコール名

【大腸21】 Bev(3W)

投与スケジュール

3週毎

	薬剤名	投与量	点滴速度	day1	day8	day15
①	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	●	×	×

備考

①初回90分、2回目60分、以降30分まで短縮可

衣笠病院 化学療法委員会